

Test sluha

Provjera sluha pokazuje, dali dijete normalno čuje?

Kako se test odvija?

Dok dijete spava, umetne se mala sonda u ušni kanal. Pregled traje kratko, samo nekoliko minuta i potpuno je bezbolan za vašu bebu.

Zašto je ovaj test potreban nedugo nakon rođenja?

1-2 djece od 1000 ima oštećenje sluha. Za dobar razvoj ove djece važno je da što ranije dobiju dobru terapiju. Tko dobro čuje, nauči bolje i lakše govoriti i jezik se brže razvija.

Što se događa ako se test sluha ne položi?

Postoje različiti razlozi zašto test može biti negativan. Ostaci amnionske tekućine mogu začepiti ušni kanal. Ovo nije razlog za brigu i riješit će se samo od sebe. Međutim, može se identificirati i oštećenje sluha.

Ako je test negativan, potrebno ga je ponoviti nakon nekoliko tjedana!

Da li se test radi na svim novorođenčadima?

Provjeru sluha treba obaviti na oba uha svih beba. Zdravstveno osiguranje plaća ovaj test. Pitajte ako niste sigurni je li vaša beba testirana. Rodilišta ili male bolnice koje nemaju uređaj za probir moraju poslati bebe pedijatru ili klinici na pregled. Čak i ako je vaše dijete rođeno kod kuće, potrebno je obaviti pregled sluha.