



Schweizerische Vereinigung der Eltern hörgeschädigter Kinder

Association suisse de parents d'enfants déficients auditifs

Associazione svizzera dei genitori di bambini audiolesi

Test İřitme taraması

İřitme taraması çocuęun normal İřitip İřitmedięini gösterir.

Test nasıl alıřıyor?

ocuk uyurken kulak kanalına kk bir sonda yerleřtirilir. Test sadece birkaç dakika srer ve bebeęiniz iin tamamen aęrısızdır.

Bu test neden doęumdan kısa bir sre sonra gereklidir?

Her 1.000 ocuktan 1-2'si İřitme engellidir. Bu ocukların iyi geliřebilmeleri iin mmkn olduęunca erken dnemde iyi bir terapi almaları nemlidir. İyi duyanlar daha iyi ve kolay konuřmayı ęrenir ve dilleri daha hızlı geliřir.

İřitme tarama testi geilmezse ne olur?

Testin negatif ıkmasının birkaç nedeni olabilir. Amniyotik sıvı kalıntıları kulak kanalını tıkayabilir. Bu endiřelenecek bir Őey deęildir ve kendi kendine hallolacaktır. Bununla birlikte, İřitme bozukluęu da tespit edilebilir.

Test negatif ıkarsa, birkaç hafta sonra tekrarlanmalıdır!

Test tm yeni doęanlara uygulanıyor mu?

İřitme taraması tm bebeklerin her iki kulaęına da yapılmalıdır. Bu testin cretini saęlık sigortası Őirketi der. Testin bebeęinize yapılıp yapılmadıęından emin deęilseniz sorun. Tarama makinesi olmayan doęum merkezleri veya kk hastaneler, bebekleri kontrol iin bir ocuk doktoruna veya klinięe gndermelidir. Bebeęiniz evde doęmuř olsa bile İřitme taraması yapılmalıdır.